

نيماكور 10%GR

حبيبي

نمكور® 10% GR

Nemacur® 10% GR



يحتوي: 10% Fenamiphos

مستحضر لمكافحة النيماتودات (الديدان الثعبانية) في المحاصيل الزراعية المختلفة

عام:

نيماكور مبيد للنيماتودات. تابع مجموعة الفوسفور العضوي. يفعل كسم تلامسي. يستوعب عن طريق الجذور وينتقل الى أوراق ونموات النبات. نيكور يبيد أيضاً النيماتودات التي تتطور داخل خلايا النبتة. له مجال إبادة واسع على النيماتودات الحرة. النيماتودات الدرنية. نيماتودات الساق والبصيلات. نيماتودات الأوراق. ليس له أي تأثير على نيماتودات لونغيدروس

كيفية الاستعمال:

الموعد الأخير للإستعمال	كيفية استعمال المستحضر	المقادير للدوغم	الآفة	المحصول
90 يوم	قبل الزرع. بذر ودمج العلاج بالتربة بواسطة الفرامة بعمق 20 سم علاج مرة أخرى إذا طُلب: بعد 6 أسابيع من العلاج الأول وإدخاله للتربة بواسطة الري	4-6 كغم	نيماتودات حرة من نوع برتيلنخوس نيماتودات درنية	البطاطا، الفسنق، الجزر
90 يوم	قبل الإنبات وقبل التشتيل. بذرة بعرض 30 سم على أسطر الزرع أو التشتيل وإدخاله للتربة بواسطة الري	6 كغم	نيماتودات درنية	بندورة، كوسا، خيار، شمام
90 يوم	العلاج الأول بعد الإنبات العلاج الثاني بعد مرور شهر ونصف وإدخاله بواسطة الري	4 كغم	نيماتودات الساق والبصيلات	بصل، ثوم
90 يوم	بذرة على سطح التربة. على طول أسطر التنقيط وتشغيله بالري	6-8 كغم	نيماتودات درنية والحرة	كروم العنب، البرقوق
—	بذرة داخل حفرة الغرس	25غم لكل غرسة	النيماتودات الشريطية	موز قبل الغرس
60 يوم	بذرة حول بيت الموز وتشغيله بواسطة الري بمعدل 30 م³ للدوغم. يلزم ثلاثة إستعمالات خلال السنة			موز في البساتين القائمة

تكملة نيماكور....

الموعد الأخير للإستعمال	كيفية استعمال المستحضر	المقادير للدونم	الآفة	الحصول
	الاستعمال الأول: عند ظهور الإصابة الأولى وليس قبل شهر أوكتوبر الاستعمال الثاني: بعد مرور 6 أسابيع من العلاج الأول	6-8 كغم	النيماتودات مكونة الأكياس "تشتيتوت"	قُرْنِفَل
	بذره على سطح التربة وإدخاله بواسطة الري بالرشاشات. يجب العلاج مرة كل شهرين.	4 كغم	النيماتودات الدرنية	جربرة
	يطلب علاجين خلال السنة: الأول بالشتاء والثاني بعده بشهرين (بداية الربيع)	3-4 كغم	نيماتودات الأوراق	روسكوس

خطورته للبيئة: سام للكائنات المائية.

تصنيف: I خطر جداً

رقم UN: 2783

عبوات: 1 كغم / 25 كغم