



MOVENTO[®] 100 SC

מובנטו[®] מופינטו

5 L net

5 ליטר



תרכיז רחיף

קוטל חרקים לפרדס, אבוקדו, גפן, תפוח, אגס,
רימון, ירקות, תבלינים ופרחים

מכיל: 100 גרם לליטר Spirotetramat
היתר חומרי דילול והרטבה

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק לפיה

רעילות IV (מסוכן) מספר או"מ: 3082

ברשיון האגף להגנת הצומח מס': 4072/הצ/2011

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד

للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال البيتي

Bayer



עודכן R 07/2024

IL80494394D



כללי:

מובנטו הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה (חומצות טטרמיות) ובעל מנגנון פעולה חדיש הגורם לעיכוב סינתזת חומצות השומן הדרושות ליצירת ממברנות התאים בגוף המזיק. התכשיר סיסטמי דו כיווני ומועבר לכל חלקי הצמח אליהם יש זרימת מומסים (הן בעצה והן בשיפה). לאחר קליטת התכשיר ע"י הדרגות הצעירות של מזיקים מוצצים למיניהם, יכולתן לעבור לדרגות מתקדמות יותר נפגעת (אורך זמן התמותה תלוי בדרגת המזיק ו/או תנאי הסביבה). לתכשיר גם השפעה על נקבות בגרות ע"י פגיעה ביכולת להטיל ביצים.

מובנטו פועל להדברת מזיק המטרה בעיקר כרעל קיבה. לאחר חדירת החומר לרקמת הצמח מתרחשת טרנספורמציה כימית אשר בעקבותיה החומר הופך רעיל למזיקי מטרה. לכן, יעילות ביולוגית מלאה תלויה ביכולת החדירה של החומר הפעיל לתוך רקמות העלים והעברתו לכל חלקי הצמח דרך מערכות ההובלה. חדירה וסיסטמיות ועל כן יעילות, עלולים להיות מופחתים כשישום התכשיר מתבצע במהלך תקופה בה הצמח סובל מעקות פיזיולוגיות (כדוגמת קור או יובש) או במהלך תקופה בה הצמח לא מתפתח/גדל באופן פעיל. מסיבה זו, הפעילות המיטבית של התכשיר מובנטו מושגת ביישום על עלווה ירוקה צומחת ועל ענפונים צעירים. כמו כן, כיסוי הצד התחתון של העלים יבטיח חדירה והובלה של החומר הפעיל בצמח באופן מיטבי.

התכשיר נחשב כרך לאויבים טבעיים ולכן יכול לשמש ככלי חשוב במערכת של הדברה משולבת. התכשיר אינו רעיל לדבורים בגרות ואינו נחשב כמסוכן לוולדותיהן בתנאי שדה רגילים.

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. עלול לגרום לריגוש בעור. חשוד כפוגע בפוריות או בעובר אדם, לא לנשים בגיל הפוריות.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות בחומרי הדברה: בעת הטיפול יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע ישיר של החומר עם איברי הגוף ובגדים. בעת טיפול עם החומר המרוכז יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש להשתמש בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3). בעת הטיפול בתכשיר יש להשתמש במסיכת חצי פנים (תקן EN) 140 (EN- עם מסנן (תקן EN-(14387 מסוג ABEK-P) ומשקפי מגן (תקן EN-166).

מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים. אין להימצא בענן התרסיס. אל תאכל, אל תעשן ואל תשתה בזמן הטיפול בחומר.

סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל הריסוס בחלקו במים, שפוך את הכמות הדרושה של התכשיר לתוך רשת הסינון שבפנת המיכל, הפעל את המערבל ושטוף את התכשיר לתוך המיכל בעת הוספת יתרת המים.



אופן היישום: חובה לדאוג לכיסוי עלווה מירבי:

הגידול	הפגע	מיון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
גפן	משפחת הקימחיתיים (כנימה קמחית של הגפן)	0.09% מעל נפח תרסיס של 100 ליטר.	100-120	7	בחלקות עם היסטוריה של נגיעות מומלץ ליישם בתום פריחה. מועד יישום התכשיר עם תחילת הנגיעות בגזע טרם עלייתה לנוף הגפנים. אין ליישם לפני דילול שריגים. אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
הדרים	כנימה אדומה אקרית חלודה	0.09%	200-400	14	מועד יישום מובטו כנגד אקרית חלודה בנגיעות נמוכה מ-2 אקריות בממוצע לשדה זכוכית מגדלת! ¹ מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשרצה.
תפוח	כנימת עלה הספיראה צמרית התפוח (כנימת דם)	0.09%	130-180	14	יישום בודד בעונה.
אבוקדו	כנימה אדומה	0.09%	100-200	45	מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשרצה.
רימון ²	כנימות עש כנימת הרימון	0.09%	100-150	14	יש לרסס על נפח עלווה מלא. מועד יישום התכשיר עם התחלת הנגיעות בשטח.
אגס	פסילת האגס	0.09%	180-200 בהתאם לגודל העץ	7	יש לרסס על נפח עלווה מלא. יישום התכשיר עם הטלת דור קיצי ראשון. במידה ודור קיצי ראשון מתחיל לבקוע לפני נוף מספק, יש להשתמש בחומר אחר לפני השימוש במובטו. במקרה של ערב דורות יש להתייעץ עם מדרן. יש ליישם את התכשיר לא פחות מ-10 ימים לאחר טיפול CCC במטע.

הערות: 1. זכוכית בעלת הגדלה של פי 10 ושטח ראייה של 2.25 סמ"ר.
2. ברימון, 2 יישומים בריסוס במרווח של 30 יום לפחות ללא שילובים.

שילובים: בגפן (זנים: רד גלוב, סופריר, קריניאן, SBS) ניתן לשלב עם התכשיר: נתיבו 75% ג.ר.. (זנים: קריניאן, SBS) ניתן לשלב עם התכשירים: פוליקור 250 ת.מ. ובאיפידן 250 ת.מ..

יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב. השילובים נבדקו רק בזן שצין, יש לבחון את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי. בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.



הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות		
בצל	תריפס הטבק	35	20-40	14	ריסוס ראשון החל מגיל 3-4 עלים, ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ- 14 ימים.		
גזר	פסילת הגזר	100	20-40	30	התכשיר מדביר אך ורק את שלב הנימפות. יש ליישם בשלב בו אורך העלווה לפחות 15 ס"מ ועם הופעת ביצי הפסילה.		
כרוב, ברוקולי, כרובית, קולורבי קולורבי	כנימת עש הטבק	50	20-40	3	בגידול המזרע בתחילת העונה, טרם הופעת המזיק שגדה יש ליישם את התכשיר עם הופעת נגיעות בשטח. בשתילות חדשות בשיא עונת פעילות המזיק יש ליישם כשבועיים משתילה (מועד בקיעת ביצי המזיק).		
		50	20-40				
		50	20-40				
		50	30-60				
		50	30-50				
		50	20-100				
		50	30-60				
		50	20-40				
		50	15-30				
		50	20-100	3	שני ריסוסים במרווח של לא פחות משבוע בין הריסוסים. מדביר דרגות צעירות בלבד.		
אבטיח	כנימת עש הטבק	50	20-40	7	ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ- 14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.		
מלון		50	20-40	7			
קישוא		50	20-100	3			
חציל		50	20-100	3			
עגבנייה		50	20-100	3			
דלורית, דלעת		50	20-100	3			
חסה		50	20-100	3			
שעועית		50	20-100	3			
פלפל		תריפס קליפורני	50	20-100		3	שני ריסוסים במרווח של לא פחות משבוע בין הריסוסים. מדביר דרגות צעירות בלבד.

שילובים: בבצל (זנים: מיקדו, אדום ואורלנדו 686) ניתן לשלבו עם התכשירים: נתיבו 75% ג.ר., ומיתוס 300 ת.ר..

בהדרים זנים - סן רייז, אורה, נובה, ניו הול, אשכולית אדומה, ולנסיה, וושינגטון, טבורי וטופז - ניתן לשלבו עם התכשיר דורסן. זנים - פומלו, אשכולית לבנה, אשכולית אדומה, לימון, אור, אורה, פומלית, טופז, וולנסיה - ניתן לשלבו עם התכשיר שמן JMS.

כרוב (זנים: פרוקטור) ניתן לשלב עם התכשירים: בייסקיה 240 ת.ש.מ., מאצ'ו 50 ת.ש..

באבטיח (זנים: 616) ניתן לשלב עם התכשיר נתיבו 75% ג.ר., (זנים: מללי, מקסימה) ניתן לשלב עם התכשיר בייסקיה 240 ת.ש.מ..

בלמון (זנים: גלורי, מירון, גלנט, יניב) ניתן לשלב עם התכשיר בייסקיה 240 ת.ש.מ..

בקישוא (זנים: קוריסט, טופזיו, שורוק) ניתן לשלב עם התכשיר: שמן קייצ' JMS. (זנים: קוריסט וטופזיו) ניתן לשלב עם התכשיר: בייסקיה 240 ת.ש.מ..



בחציל (זנים: קלאסיק, מרגריטה, 1726) ניתן לשלב עם התכשירים: טלודר 500 ת.ר..
בעגבייה (זנים: טרה קוטה, שרי תמר, ניקוס, ברונו ומוזה) ניתן לשלב עם התכשיר: ביסקיה
 240 ת.ש.מ..

בל השתמש תוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.
 השילובים נבדקו רק בזן שצוין, יש לבחון את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי.
 בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

המשך אופן היישום:

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
תבלינים: בזיל, עירית, רוקט, רוקולה, בצל ירוק, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, כוסברה, שמיר, פטרזיליה, כרפס עלים	כנימת עש הטבק תרפיס הטבק כנימת עלה הדלועיים	50	20-50	7	מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח.
פרחים ³ : ליזיאנטוס, טרכליום, גרברה, סולידגו, נץ החלב	כנימת עש הטבק	50	100-120	-	מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח. ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח שלא פחות מ- 14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.

הער 3. זני פרחים שנבדקו: ליזיאנטוס - mc-1 לבן, רוזיטה לבן, מיראז' לבן, לונה רוז (ורוד), מורט מרין (כחול לבן), טרכליום - כחול, גרברה - אולטימה, אווה-מריה, אופרטי, סולידגו - גולדן גלורי, נץ החלב - דוביום.
 בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק בטיחות התכשיר לכל זני צמחים.
 אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.



בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: במקרה של מגע יש לרחוץ היטב את המקום עם מים וסבון. עם גמר הטפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשדה ולחממות: עם התייבשות התרסיס מותר להיכנס מחדש לשטח. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה. **תכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה. **טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפים אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מסודר.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה, הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של **בליעה** יש לפנות הנפגע לרופא. במקרה של זיהום **בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום **העור**, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

טלפון מס': 04-7771900

המרכז הארצי למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם

תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.



MOVENTO[®] 100 SC

מובנטו[®] מופינטו

5 L net

5 ליטר

2xSYS

תרכיז רחף

קוטל חרקים לפרדס, אבוקדו, גפן, תפוח, אגס,
רימון, ירקות, תבלינים ופרחים

מכיל: 100 גרם לליטר Spirotetramat
היתר חומרי דילול והרטבה

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק לפיה

מספר אי.מ: 3082

רעילות IV (מסוכן)

ברשיון האגף להגנת הצומח מס': 4072/הצ/2011

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד

للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال البيتي

Bayer



עידכון R 06/2024

IL80494394D



موفينتو

درجة السُميية: **IV (خطر)** مبيد حشري جهازي رقم الأمم المتحدة: **3082**

مبيد حشرات لبستان البصل مصنف

والعنب و تفاح والإجاص والخضار

والتوابل والزهور

يحتوي: ١٠٠ غرام للتر

Spirotetramat

الباقي مواد إذابة وترطيب

اقرأ الملصقة بتمعن قبل

الاستعمال

عالم موفينتو هو مستحضر من مجموعة كيميائية جديدة (تابع للأحماض البيئرونيكية) ذو آلية عمل حديثة يتسبب في تعطيل التركيب الكيميائي للحامض الدهني المطلوب لإنتاج أغذية الخلايا في جسم الآفة المستحضر عصاري كامل ويتحرك بالأجابه وينقل إلى جميع أجزاء النبتة التي تتغذى عليها المواد المداية عن طريق الإزعة الخشبية والحاء. بعد امتصاص السم عن طريق صغار الآفات الماصة على اختلاف أنواعها فإنها لا تتمكن من الانتقال إلى أطوار ودرجات أكثر تقدما وبالتالي وفي نطاق زمني من ٢ إلى ٥ أيام تموت الآفة (إطالة مدة الموت يعتمد على درجة الآفة و/أو ظروف البيئة) للمستحضر تأثير على الإناث البالغات أيضاً بواسطة الإخلاق في قدرتها على وضع البيض. يعتبر المستحضر وديا بالنسبة للأعاء الطبيعية ولذلك يمكن استخدامه كعبد هام في برنامج مكافحة المتكاملة. المستحضر غير سام للنحل البالغ ولا يعتبر خطراً لورقات النحل في ظروف استعمال ورش مناسبة. يعمل موفينتو على إبادة الآفة الهدف في الأساس كسم للمعدة. بعد دخول المادة إلى تسيج النبتة تحدث عملية تحوّل كيميائية تتحوّل المادة في أغلبها إلى مادة سامة لآفات الهدف. لذلك إن النجاعة البيولوجية الكاملة مرتبطة بفترة تغلغل المادة النشطة إلى داخل أنسجة الأوراق ونقلها إلى كل أجزاء النبتة عبر منظومات النقل. إن التغلغل والتهجئة وكذلك النجاعة من الممكن أن تكون مخففة عندما يتم تطبيق استخدام المستحضر خلال فترة تعاقب فيها النبتة من معيات فيسيولوجية (مثل البرد أو الجفاف) أو خلال فترة لا تتطور/تتنو فيها النبتة بشكل ناطر لهذا السبب، إن النشاط الأقصى للمستحضر موفينتو يتحقق من خلال تطبيقه على أوراق خضراء ناعية وعلى فروع صغيرة جداً، كذلك، فإن غطاء الجانب السفلي للأوراق يضمن تغلغل ونقل المادة النشطة في النبتة بصورة قصوى.

تحذيرات: قد يؤدي إلى تهيج الجلد. لا يوصى للساء في فترة الحساسية، ممكن أن يضر بالإجاص، والحق ضرر بالحيثن.

وسائل الحذر:

يجب التخلّص ووسائل الحذر المتبعة عند استعمال المستحضر وفقاً لقواعد الحذر مع المبيدات: عند الاستعمال يجب الامتناع عن بلع، استنشاق المعلق والشمس المباشرة للمادة مع أعضاء الجسم والملابس يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات مطيابة ومأوية للمواد الكيميائية عند التعامل مع المستحضر المركز، متوخّح من الرب، تناول الطعام أو التدخين أثناء استعمال المستحضر. يوصى باستعمال قفازات مانعة (حسب معيار EN374) / أيضاً كمامة نصف وجه (معيار EN140) وإيضاً مع قفاز. (معيار EN14387 من نوع ABEK3) وإيضاً نظارات حماية (معيار EN166).

مخاطر بيئية: سام للكائنات التي تعيش في الماء - قد يسبب طوارٍ سلبية طويلة الأمد للنبتة المائية.

تحضير مادة الرش: امداء وعاء الرش حتى نصفه بالماء، اسكب كمية المستحضر المطلوبة إلى داخل شبيكة التصفية التي في فتحة العرش، ثمّل الخلاط والظف المستحضر لداخل وعاء الرش أثناء إضافة باقي كمية الماء المطلوبة.



كيفية الاستعمال:

المصوّل	الأفة	الجرعة (سم² للونم، أو %)	حجم الرش (لتر للونم)	الموعد الأخير للرش قبل القطف (أيام)	ملاحظات
رمان	حشره عث الرمان	0.09	150-100	70	موعد الرش: في بدايه ظهور الحشره واكتساء الشجره بالاوراق
الإجاص	بببلا الإجاص	0.09	180 – 200 حسب كبر الشجرة	7	يجب الرش عندما تنكسي الأشجار كامل أوراقها. الرش عندما تبيض الحشرات الطور الصفي الأول. في حال أن الطور الأول يبدأ بالتفقس قبل اكتمال أوراق الشجرة يجب استعمال مادة غير الموقتة. في حال التماوج الأطوار يجب الاستشارة بالمرشد. يجب رش المادة ليس قبل 10 أيام من علاج CCC في البستان.
تفاح	من السبيرييا المن القطني	0.09	130-180	14	معالجه واحده في الموسم
بصل	تربس التبغ	35	40 – 20	14	الرش الأول بدءاً من سن 3 – 4 ورقات، الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يوماً
أفوكادو	الحشرة القشرية الحمراء	0.09%	100-120	45	عسمة مكره: 10* ومساحة السطح 2.25 ستمتر
حمضيات	الحشرة القشرية الحمراء عنكبوت الصدا	0.09%	400 – 200	14	موعد رش الموقط لمكافحة عنكبوت الصدا عند رؤية أقل من عنكبوتين لمساحة عسمة مكره
كرمة (عنب)	بق العنب النقي	0.09% أكثر من حجم 100 لتر من المستحضر أو 90 سم مكعب للونم بحجم مستحضر يقل عن 100 لتر	100-120	7	في قطع الأرض التي لها تاريخ في الإصابة يُنصح بالاستعمال في نهاية الإزهار. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم. موعد رش المادة لمكافحة الحشرة القشرية الحمراء. موعد رش الموقط لمكافحة الحشرة القشرية الحمراء في بداية الربيع، في فترة وضع البيض.
دلويت، بظن	النبابة البيضاء	50	60 – 30	3	



المحصول	الإفة	الجرعة (مسة للونم، أو %)	حجم الرش (لتر للونم)	الموعد الأخير للرش قبل العطف (أيام)	ملاحظات
ملفوف، بروكلي، قرنبيط	حشرة عث التبغ	50	40-20	3	في المحاصيل التي زرعت في بداية الموسم، قبل ظهور الإفة في الحقل يجب استعمال المستنصر مع ظهور الإصابات في الموقع. في الشتلات الجديدة في ثروة موسم نشاط الإفة يجب استعماله قبل الزرع بأسبوعين (موعد تقليب بيض الإفة). الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يومًا. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم.
بطيخ	حشرة عث التبغ	50	40-20	3	
شمام	حشرة عث التبغ	50	40-20	3	
كوسا	حشرة عث التبغ	50	60-30	3	
بالدجان	حشرة عث التبغ	50	50-30	3	
الخص	حشرة عث التبغ	50	40-20	7	
فانوليها	حشرة عث التبغ	50	30-15	7	
قلل حلو، بندورة	حشرة عث التبغ	50	100-20	3	
التوابل: ربحان، ثوم معمر، جرجير، روكولا، بصل أخضر، نعنع، مريمية، زعر، إكليل الجبل، طرخون، كزبرة، شبت، بقونس، كرفس	حشرة عث التبغ تؤيس حشرة من القطن	50	50-20	7	موعد استعمال المستنصر مع ظهور الإفة في الحقل.
الزهور* ليزيانتوس، زهرة الجرس، جريزاء، عصا الذهب، هليون	حشرة عث التبغ	50	100-200	-	موعد استعمال المستنصر مع ظهور الإفة في الحقل. الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يومًا. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم.
جزر	ببيلال الجزر	100	40-20	30	المادة تعالج فقط اليرقات، يجب الرش عند وصول أوراق الجزر إلى 51 سنتمتر ومع ظهور بيوض الببيلال

في المحاصيل (الأصناف): أورا، نرفا، نيو هول، أشكوليت حمراء، فلسيا، واشنطن، طوري وتوبال) يمكن نمجه مع المستنصر دورسان

*أصناف الزهور التي تم فحصها: ليزيانثوس - mc-1 أبيض، روزيتا أبيض، مبراج أبيض، لونا زور (وردى)، مورت مارين (أزرق أبيض)، زهرة الجرس - أزرق، الجريزاء - أوليتما، إيفاجيريا، أوبوتي، عصا الذهب، جولان غوري، الهليون - دويوم. بسبب كثرة الأصناف المتوفرة من الزهور والوردة أعلاه ليست لدينا إمكانية لفحص سلامة المستنصر على جميع أصناف النباتات. قبل تجريب المستنصر على الأصناف المختلفة، ينبغي التجريب في البداية على عدد محدود من النباتات. الخطأ في حاله عدم وجود معلومات أخرى يمنع حفظ العنق مع مستنصر آخر.



عند الانتهاء الاستعمال:

تنظيف العرش: في نهاية الرش يجب إفراغ الوعاء من البقايا حسب تعليمات التخلص من مياه التنظيف. ومن ثم شطف العرش وجميع أجزائه بالماء والمادة المنظفة. يجب التخلص من مياه الشطف حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف.

التخلص من مياه الشطف: ممنوع تقوية وشطف المستحضرات أو البقايا من جهاز العرش، من وعاء التجميع أو من أي وعاء آخر إلى الحوض، برك الأسماك وأي مصارف وتجمعت مياه على اختلاف أنواعها. يجب التخلص من مياه الشطف بطرق مصادق عليها على يد وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في حقل زراعي، استعمال منكر، تطهير، تخيير وإخلاء موقع النفايات السامة في رמת حوفان.

الحماية الشخصية عند الانتهاء العمل: في حال التماس، يجب غسل المكان جيدا بالماء والصابون. عند الانتهاء من العلاج، يجب غسل الجسم جيدا وخصوصا الأجزاء التي كانت مغطاة أثناء الرش وتبديل الملابس. يجب غسل ملابس العمل على انفراد وتنظيف معدات الوقاية بواسطة مادة تنظيف.

الدخول من جديد للحقل والبيوت البلاستيكية:

عند جفاف المحلول مسموح بالدخول للحقل من جديد. التكرين: يجب تخزين المستحضر في مخزن مغلق والمخصص لتكرين مواد مكافحة الحشرات، وبعيدا عن متناول أيدي الأولاد والأشخاص الغير مؤهلين. يجب إعادة المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من عملية الرش وعدم تركها في الحقل.

مستحضر مسويب: يجب سكب الرمل أو نشارة الخشب على المستحضر المسكوب، وجمعه ونقله إلى موقع النفايات السامة.

إبادة البعوات الفلانة: يجب شطف البعوات الفلانة ثلاث مرات وإضافة مياه الشطف للمادة الموجودة في خزان الرش. بعد ذلك إلقاءها في حاوية القمامة.

إسعافات أولية: في حالة الاشتباه بحادث تسمم، أخرج المصاب إلى الهواء الطلق واجعله يستلقي في مكان مظلم ومبوا وأحرص على الحصول على مساعدة فورية من قبل طبيب مع إحضار ملصقة المبيد. في حالة **البلع** يجب إخلاء المصاب إلى الطبيب. في حالة بلع **العينين**، يجب شطفهما بماء نظيف جاري لمدة ١٥ دقيقة والتوجه إلى الطبيب. في حالة بلع **الجلد**، قم بغسل المكان المصاب بالماء والصابون.

معلومات للطبيب: المركز القطري للمعلومات عن التسمم، مستشفى رמת، هاتف رقم: ٠٤-٧٧٧١١٠٠.

Manuf. Date: "See on pack"
Expiry Date: 3 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No: "See on pack"

حنتنة المصنفة:

بترخيص من قسم وقاية النبات رقم: ٠١١/٢٠١١/٠٧٢

ليس للاستعمال المنزلي للاستعمال الزراعي فقط

شروط البيع:

ليدور للكيمويات حرض شارع هفتينيم، ص.ب. ١١٦ رמת حشارون ٤٧١٠٠ هاتف: ٠٣-٧٦٠٢٢٢٢

نحن مسؤولين عن ملائمة هذا المستحضر التركيبية الكيميائية لرفعته المستحضر وبملائته للأهداف المرح بها على ظهر الرقعة. فقط عندما يتم استعمال المستحضر حسب التعليمات. في ظروف استعمال عادية مسؤليتنا المذكورة أعلاه لا تسري في حالات استعمال المستحضر بشكل يخالف التعليمات المودنة في الرقعة أو في ظروف استعمال غير عادية أو يتصرف غير متوقعة لدينا. في حالات مثل هذه تسري المسؤلية بكاملها على مشتري المستحضر وعلى من يستعمله فقط. كل مسؤلية أخرى مباشرة أو غير مباشرة لا تسري علينا.

التنح: Bayer AG

إنتاج: Bayer AG