



اقرأ الاصلقة بتعمّن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.
קראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה

רשיון השיירותים להגנת הצומח: 87 / הצ / 1040
ترخيص قسم الخدمات لوقاية النبات 87 / ون / 1040

שימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال הביתי



לידור אלמנטס בע"מ רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-7606222

LIDORR ELEMENTS LTD. Haneviim Str. P.O.B. 116
4710002 Ramat Hasharon TEL. 03-7606222

מס' אצווה

Bayer



פוליקור 250 - مستحضر عصاري لمكافحة الأمراض الفطرية في الكروم، البساتين، محاصيل الخضروات.

כללי: פוליקור קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים שנקלט ע"י הצמח ומועבר מנקודת הקליטה כלפי מעלה. התכשיר פועל במניעה ובריפוי מחלות רבות, ואף במקרים מסויימים פוליקור פועל להכחדת נגיעות קיימות.

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בנשימה ובליעה, עלול לגרום לריגוש בעור. גורם לגירוי קשה לעיניים, עלול לגרום לגירוי בנשימה, חשוד לפגיעה בעובר, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.

אמצעי זהירות ומיגון: יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השער.

יש ללבוש כפפות ניטריל לפי תקן (EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) מסוכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג P3-ABEK.

יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר עימו ידיים או בעיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

במקרה של שילוב עם תכשיר נוסף, יש להתחשב גם באמצעי הזהירות המפורטים בתווית התכשיר הנוסף.

סכנות לסביבה:

רעילות נמוכה לדבורים. רעיל מאוד ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. עלול לזהם מי תהום.

הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הפוליקור הדרושה. ממישים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

**אופן היישום בספרון המצ"ב
בגמר השימוש:**

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס, יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים אח"כ יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס, יש לרחוץ ידיים וחלקי הגוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: עם ההתייבשות המוחלטת של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון: לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית וסגורה במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

חומר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר הפסולת הרעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מסודר.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא והצג בפניו תווית זו. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900
מعلومات للطبيب: مركز المعلومات في حالة التسمم ت: 04-7771900

מתי מכירה: אם אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים, אחרותם, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנודדת את ההוראות המציינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידם. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

אופן יישום:

הגידול	המחלה	מינון לדונם	נפח תרסיס ל"ד'	ישום התכשיר	ריסוס אחרון לפני קטיף
חיטה *	ספטוריה עלי החיטה חילדון	50 סמ"ק	10-30		60 יום
כותנה	כתמי חלפת	75 סמ"ק	10-30	מרווחי ריסוס מדי 14 יום לפי סף פעולה מקובל	21 יום
תירס מתוק/ מספוא	חלדון התירס	75 סמ"ק	10-30		21 יום
חמנייה	חלדון החמנית	50 סמ"ק	10-30	טיפול עם התחלת נגיעות בעלים עלונים	21 יום
אגוזי - אדמה	כתמת אגוז אדמה (צ'רקוספורה)	100 סמ"ק	30	מרווחי ריסוס מדי 14 יום	21 יום
גזר	קמחון הגזר כתמי חלפת	75 סמ"ק	10-30	מרווחי ריסוס מדי 14 יום	21 יום
שום	חלדון הבצל והשום כימיון שקעים (סטמפיליום)	75 סמ"ק	10-50	מתחילים בטיפול מונע לא יאוחר מהופעת צברי חילדון ראשונים בחלקה או תחילת נגיעות בסטי מפיליום	21 יום
בצל	כימיון שקעים (סטמפיליום)	75 סמ"ק	10-50		21 יום
כרפס	קישיונה גדולה ספטוריה	75 סמ"ק	30-50	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21 יום
כרובית, ברוקולי	חלפת המצליבים	75 סמ"ק	30-50	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21 יום
תפוח - אדמה**	חלפת	75 סמ"ק	10-30	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21 יום
חימצה	שידפון אסקוכיטה בחמצה	75 סמ"ק	10-30	חוזרים על טיפול נוסף עם הופעת נגיעות חדשה במחלה	21 יום
עגבניות לתעשייה	קמחונית חלפת סולניים	75 סמ"ק	10-30	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21 יום
גפן	קמחון הגפן	0.02%	70-120	מרווחי ריסוס מידי 21 - 14 יום	21 יום
שזיף אירופי	חלדון הגלעיניים	0.02%	100-150	מרווחי ריסוס מידי 30-21 יום	21 יום
שזיף יפני	חלדון הגלעיניים ריקבון חום (מוניליה)	0.02%	100-150	מרווחי ריסוס מידי 30 - 21 יום	21 יום
שקד	חלדון הגלעיניים ריקבון חום (מוניליה) נמשון השקד	0.02%	100-150	מרווחי ריסוס מידי 21 יום	21 יום
משמש	חלדון הגלעיניים	0.02%	100-150	מרווחי ריסוס מידי 21 יום	21 יום

* חיטה: סף הפעולה לחילדון - 25 צברי חילדון למדגם של 100 צמחים. סף הפעולה לספטוריה - כש 50% מהעלים מספר 4 מלמעלה ננועים. אין לרסס אחרי הבשלת חלב.
** תפוזי: התחלת טיפולים לאחר סגירת נוף.

המשך אופן יישום פוליקור 250 ת.מ.:

הגידול	המחלה	מינון לדונם	נפח תרסיס ל"ד'	ישום התכשיר	ריסוס אחרון לפני קטיף
הפיריקום	חילדון	50 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס פחות מ- 100 ל"ד' 0.075% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	50-100	ריסוס לא לפני שהצמח מגיע ל- 50 ס"מ גובה. מרווחי ריסוס מידי 14 יום, אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים בעונה.	
ציפורן	חלפת הציפורן	0.075% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד' 75 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס פחות מ- 100 ל"ד'	50-100	מרווח מומלץ בין הטיפולים - 10-14 יום	-----

כדי לשמור על יעילות התכשיר ולדחות הופעת עמידות רצוי להשתמש במחזוריות גם בתכשירים מומלצים אחרים.

שילובים: בגפן: ניתן לשלב את פוליקור 250 ת.מ עם אחד מן התכשירים הבאים:

מובנטו 100 ת.ר. (זנים: קריניאן, SBS), מרפאן, רדומיל, מנצידן.

בתפוזי: עם אפלורד, מנצידן, מנקור.

יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.

בהעדד מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

פוליקור 250®

מסתחצר עשירי لمكافحة الأمراض الفطرية في الكروم, البساتين. محاصيل الخضروات.

עמ: פוליקור מביד פטריות תאב לנטיה התריאזוליים יסתובב וינטיש בעצרה לאעל

הנטיה. יכאכח וימנע האמراض الفطرية وايضاً يفعال لآبادة تامة للآصابة الموجودة.

תחזיר: יضر بالتنفس والبلع. هنالك خطر للعينين. يضر بالجنين. لا يسمح للنساء باستعماله في فترة الحبوبه

תעלמות האסתعمال:

وسائ الحذر: ملابس عمل طويله مخصصه للعمل بمواد كيميائيه. حذاء واقى . وظيفه للرأس لتغطيه وحمايه الشعر. يجب استعمال كفوفه واقيه نيتزل (حسب العيار 374/3-EN). عند استعمال ماده يجب لبس كمامه كامله للوجه (حسب العيار 136-EN) مع مصفاه مدمجه لمطابقه للمعيار ABEP-P3 (EN-14387) (منوع الاكل. والشرب والتدخين عند استعمال ماده.

وعند معالجه ماده الركزه يجب وضع الكمامه الواقيه. ممنوع الشرب والاكل والتدخين عند معالجه ماده.

تأثيرات بيئية: سميه خفيفه للنحل. ملوث للمواد الجوفيه.

تخصير مخلول الرش: تخلط الكمية المطلوبة من المستحضر مع الماء وتنسكب داخل وعاء المرش المملوء حتى ثلثة بالماء وتضاف كمية الماء المتبقية مع الحفاظ على الخلط المتواصل وفي كل الاحوال عند خلط مادة أخرى يجب اضافتها في الثلث الثاني لكمية الماء في وعاء المرش.

كيفية الاستعمال:

المحصول	الآفة	المقادير للدونم	حجم الرش (لتر ماء للونم)	كيفية استعمال العلاج	الرش الاخير قبل القطف
الحنطة*	صدأ الورق سيبتيوريا	50 سم ³	10-30	—	60 يوم
القطن	اللفحة الترناريا	75 سم ³	10-30	بفترات رش كل 14 يوم حسب درجة إصابة مقبولة	21 يوم
ذرة حلوة ذرة للعلف	الصدأ	75 سم ³	10-30	—	21 يوم
عباد الشمس	الصدأ	50 سم ³	10-30	الرش مع بداية الإصابة	21 يوم
الفستق	تسريكوسيورا	100 سم ³	30	الرش كل 14 يوم	21 يوم
الجزر	البياض الدقيقي اللفحة الترناريا	75 سم ³	10-30	الرش بفترات كل 14 يوم	21 يوم
الثوم	ستمفيليوم صدأ الأوراق	75 سم ³	10-50	البداء بالرش الوقائي بكل الاحوال قبل ظهور الإصابة الاولى بالصدأ والستيمفيليوم	21 يوم
بصل	ستمفيليوم	75 سم ³	10-50	الرش كل 14 يوم	21 يوم
سلري	العفن الأبيض سيبتيوريا	75 سم ³	30-50	الرش كل 14 يوم	21 يوم
بروكولي، زهره	اللفحة	75 سم ³	30-50	الرش كل 14 يوم	21 يوم
بطاطا**	اللفحة (الترناريا)	75 سم ³	10-30	الرش كل 14 يوم	21 يوم
بندورة صناعية	البياض الدقيقي اللفحة الترناريا	75 سم ³	10-30	الرش كل 14 يوم	21 يوم
خمص	أسكوخيتا	سم ³	10-30	الرشة الثانية عند تجدد الإصابة	21 يوم

المحصول	الآفة	المقادير للدونم	حجم الرش (لتر ماء للونم)	كيفية استعمال العلاج	الرش الاخير قبل القطف
عنب	البياض الدقيقي	0.02%	70-120	الرش بفترات كل 14-21 يوماً	21 يوم
خوخ أوروبي	صدأ	0.02%	100-150	الرش بفترات كل 21-30 يوماً	21 يوم
خوخ ياباني	صدأ هونيليا	0.02%	100-150	الرش كل 21 يوم	21 يوم
لوز	صدأ هونيليا بوليستجا نمشون	0.02%	100-150	—	21 يوم
شمش	صدأ	0.02%	100-150	الآنشاء بالرش عند وصول النبتة لارتفاع 50 سم وفترات رش كل 14 يوم بمسوح الرش أكثر من مرتين في الموسم	—
هيسريكوم	صدأ	—	50-100	50 سم ³ / د حجم الرش أقل من 100 لتر للدونم (أو يتركز 0.075% حجم رش أكثر من 100 ل/د)	—
قرنفل	اللفحة الترناريا	0.075% حجم رش أكثر من 100 ل/د	50-100	بفترات رش من 10-14 يوم	—

للمحافظة على فعاليتها نأجحه وللمحافظة على المناعة من المفضل استعمال مواد من تركيبه أخرى مسموحة. * الحنطة: بداية الرش للصدأ حسب ٢٥ بقعة صدأ من عينة ١٠٠ نبتة وبداية الرش للستيتوريا عند ٥٠٪ إصابة من الورقة الرابعة وما فوق. وعدم الرش عند النضوج. * البطاطا: الأبتداء بالرش بعد تكامل كل النماوت. قابلية الخطأ: بالعنب يمكن خلطه مع: موقنطو 100 ت.ر (الأصناف المسموحة: كارينيان. sbs).

ردوميل

السيستين. سيدان. وأنتركول ومستحضرات الـBT. بالخنوخ يمكن خلطه مع برينتكس.

بالطاطا: مع أبلورد. مانفجان. مناسيدان. منكور. بالبصل والثوم: مع مسورول.

في حالة خلطه مع مستحضرات أخرى يجب الاهتمام بالتعليمات المرفقة مع المستحضر الاخر.