

297 mm

232 mm

20 mm

7 mm

2 5 mm mm

31 mm



1 ליטר

84975699C (297x150)

סיבנטו פריים
סיפאנטו בריים

עדכון תווית: 1.2024

סיבנטו פריים תרכיז נוזלי
200 ג"ר לליטר
סיפאנטו בריים
מרכז قابل للذوبان 200

GROUP 4D INSECTICID

קוטל חרקים מוצצים בירקות מטעים ופרחים

מכיל: 200 גרם בליטר Flupyradifurone

סיווג: IV (מסוכן) מס' או"ם: 3082

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה

الرجا قراءة الملصق جيدا قبل الإستعمال



للإستخدام الزراعي فقط
لا لשימוש ביתי - לשימוש חקלאי

רישיון האגף להגנת הצומח מס 4499/הצ/2021



LIDORR ELEMENTS LTD.
Haneviim Str. P.O.B.116
4710002 Ramat Hasharon
TEL. 03-7606222



יצרן התכשיר: Bayer AG
במפעל בגרמניה

לידור אלמנטס בע"מ
רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002
טלפון מס' 03-7606222

Bayer



SIVANTO prime 200 SL

סיבנטו פריים סיפאנטו

לחומר הפעיל במוצר זה תכונות ומאפיינים הקשורים בכימיקלים שזוהו במי תהום. חומר זה עשוי לחלחל למי תהום, אם בשימוש באזורים שבהם הקרקע מחלחלת, במיוחד באזורים של מי תהום גבוהים. Flupyradifurone והמטבוליטים שלו עשויים להשפיע על איכות גופי מים עיליים דרך נגר של מי גשמים. זה נכון במיוחד במקרה של קרקעות בעלות ניקוז גרוע וקרקעות רדודות. Flupyradifurone והמטבוליטים שלו מסווגים כבעלי פוטנציאל בינוני ופוטנציאל גבוה בהתאמה, להגעה לגופי מים עיליים באמצעות נגר במשך מספר חודשים או יותר לאחר היישום.

אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

- ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו המים.
- ג. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

לא נכללות באזור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% יותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% יותר.

הכנת התרסיס (ליישום בריסוס):

ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את הכמות הדרושה של סיבנטו פריים. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול. יש להקפיד בעת ריסוס סיבנטו פריים להשתמש בציד המתאים לריסוס בקוטלי מזיקים. הציד חייב להיות במצב תקין ומכיל.

בהגמעה (בעצי מיש):

יישום נקודתי ממוקד (לא במערכת השקיה):

יש לתת את התכשיר מומס ב 60-120 ליטר מים לעץ באופן יחסי, כמות המים בהתאם לגודל העץ. בהשקיה איטית ללא נגר.

ביישום דרך מערכת ההשקיה:

היישום ייעשה באמצעות הגמעה במערכת מנותקת אוויר. בין מגוף (ברז) ההשקיה, המוביל מים למשאבת הדישון ולפני משאבת הדישון, יש להתקין מז"ח (מונע זרימה חוזרת) על מנת למנוע אפשרות חדירת החומר למערכת מי השתייה.

מנת המים תחושב לפי מספר העצים לטיפול לפי 60-120 ליטר מים לעץ (בהתאם לגודל העץ) כאשר סה"כ המנה תחולק לשלושה חלקים: שלישי להרטבה, שלישי יישום מנת התכשיר ושלישי אחרון לשטיפת מערכת ההשקיה.

כללי: סיבנטו פריים הינו תכשיר סיסטמי. החומר הפעיל, Flupyradifurone, פותח בהשראת החומר הטבעי "סטמפולין", נגזרת של הצמח האסייתי *Stemona japonica* השייך למשפחה כימית חדשה. החומר הפעיל נקשר לקולטני אצטיל כולין במערכת העצבים של החרקים הרגישים ומהווה מעכב תחרותי (אגוניסט) ומונע את קישורו של המוליך העצבי. תהליך זה גורם לשיבוש בהעברת הדחף העצבי בתאים וגורם לשיטוק ולתמותת החרק.

פעילות התכשיר מהירה ובתחילתה הפסקת אכילה של הכנימות, דבר שמסייע בהפחתת העברה של ירוסים (לא חולפים) בגידולים שונים.

מכיוון שלחומר הפעיל מבנה מולקולרי מרחבי שונה מזה של תכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים, סיבנטו יעיל מאוד כנגד כנימות עש טבק המגלות עמידות לתכשירים מקבוצה זו.

התכשיר יעיל כנגד כל הדרגות הנעות של החרקים הרגישים - זחלים, נימפות ובוגרים ויעיל מאוד גם בהדברה של אוכלוסיות גבוהות.

הוראות השימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה. מזיק במגע עם העור. מזיק בנשימה. גורם לגירוי בעיניים. בחשיפה ממושכת עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. עלול לגרום לנזק לאיברים (שרירים) עקב חשיפה ממושכת או חוזרת.

אמצעי זהירות ומיגון:


יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות בחומר הדברה:

בעת הטיפול יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע ישיר של החומר עם איברי הגוף ובגדים. יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש להשתמש בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3). בעת הטיפול בתכשיר יש להשתמש במסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P ומשקפי מגן (תקן EN-166). אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול.

סכנות לסביבה: סיבנטו פריים רעיל מאוד לסביבה המימית ויש להרחיק ממקורות מים ובריכות דגים. רעיל לדבורים באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

242 mm

234 mm

5
mm

SIVANTO^{200 SL} prime

סיבנטו פריים סיפאנטו בראים

אופן היישום:

בכל הגידולים (למעט בפרחים), 2 יישומים בריסוס במרווח של 10 ימים לפחות. בפרחים ומיש, יישום בודד בעונה. אין לרסס את התכשיר בטמפ' מעל 28°C.

ימי המתנה	הערות	נפחי ריסוס (ליטרים)	המינון (סמ"ק/ד')	מזיקים מודברים	הגידול
3	יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס.	30-100	75 סמ"ק/דונם	כנימת עש טבק	חציל ועגבנייה
3		30-100	75 סמ"ק/דונם	כנימת עש טבק	פלפל בבתי רשת ושטח פתוח בלבד
3		30-70	75 סמ"ק/דונם	כנימת עש טבק	מלפפון
3		30-70	75 סמ"ק/דונם	כנימת עש טבק	קישוא, מלון ואבטיח בשטח פתוח בלבד
14		30-70	75 סמ"ק/דונם	כנימת עש טבק	כרוב, כרובית, ברוקולי
3		30-70	75 סמ"ק/דונם	כנימת עש טבק	חסה
7		100-150	0.075%	כנימת עלה הספיראה	תפוח
28		80-150	0.15%	ציקדה ירוקה	שזיף, שקד
45		ריסוס אחרון סוף מאי (לפני התהפכות הפרי)	100-150	0.075%	פסילת האגס <i>Psylla Pyricol</i>
-		30-150	75 סמ"ק/דונם או בריכוז 0.075% בגפח תרסיס 100-150 ל"ד'	כנימת עש טבק	פרחים: רוניקה ¹ , חרצית ² , יפעה (ליזיאנטוס) ³ ; עדעד (לימוניום) ⁴ ומטה זהב קנדי (סולידגו) ⁵
-			15 סמ"ק לעץ בהגמעה	כנימת עלה המיש הצמרית	מיש

242 mm

234 mm

5 mm

150 mm
144 mm

SIVANTO prime 200 SL

סיבנטו פריים סיבאנטו פריים

הצומח. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסנה: לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית וסגורה במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש לשמור את התכשיר באריזה מקורית וסגורה היטב. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

תכשיר שנשפך: על תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה. בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של **בליעה**, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא, והצג בפניו תויות זו. במקרה של **זיהום בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **זיהום העור**, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם, טלפון מס': 04-7771900

תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תויות האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו. בשטחים עם אוכלוסיית מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות, היצרן/או המשווק לא יישאו באחריות כל שהיא לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת, כיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה.

הערות לפרחים:

1. זנים בטוחים כוללים: סקיילר- לבן וכחול ובלו בוקט.
2. זנים בטוחים כוללים: CALABRIA WH ,ART ,New Day.
3. זנים בטוחים: אקסקליבר, ג'סני לבן, ארנה 3 רוז (ורוד), כרימה סילקי (לבן) ורוזיטה (לבן).
4. זנים בטוחים כוללים: סילבר פינק, קנזס סילבר וקנזס בלו.
5. זנים בטוחים כוללים: גלורי וגולדן גלורי.

שילובים: בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

עמידות: סיבנטו פריים מכיל חומר פעיל מקבוצה 4D משבשי רצפטור ניקוטניני. שימוש חוזר בקוטלי חרקים עלול להגביר את התפתחות קווים עמידים של חרקים. על מנת למנוע התפתחות עמידות יש להשתמש בחומרים מקבוצה שונה בעלי מנגנוני פעולה שונים ובשימוש בתוכנית הדברה משולבת עם חומרים ביולוגיים וניטור המזיקים. בעת חשד להתפתחות עמידות יש להתריע על כך למדריכי הגנת הצומח באזור.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל המשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איזוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: עם גמר הטיפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח המרוסס 12 שעות לאחר יישום. בכניסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים, פלג גוף עליון והזרועות עם ביגוד סטנדרטי לשימוש עם תכשירים להגנת

297 mm

232 mm

20 mm

7 mm

2 5 mm mm

31 mm



1 ליטר

סיבנטו פריים
סיפאנטו בריים

84975699C (297x150)

עדכון חוקי: 07.2023

סיבנטו פריים תרכיז נוזלי
200 ג"ר לליטר

סיפאנטו בריים

מרכז قابل للذوبان 200

GROUP 4D INSECTICID

קוטל חרקים מוצצים בירקות מטעים ופרחים

מכיל: 200 גרם בליטר Flupyradifurone

סיווג: IV (מסוכן) מס' או"ם: 3082

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה

الرجا قراءة الملصق جيدا قبل الإستعمال



للإستخدام الزراعي فقط
لا لשימוש ביתי - לשימוש חקלאי

רישיון האגף להגנת הצומח מס 4499/2021/הצ

LIDORR ELEMENTS LTD.
Haneviim Str. P.O.B.116
4710002 Ramat Hasharon
TEL. 03-7606222



יצרן התכשיר: Bayer AG
במפעל בגרמניה

לידור אלמנטס בע"מ
רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002
טלפון מס' 03-7606222

Bayer